



PUBBLICITÀ TRAMITE OGGETTO

# Protocollo di disinfezione ambientale





# Disinfezione Ambientale

Si tratta di tutta quella serie di operazioni destinate a

**bonificare le superfici e gli ambienti**

all'interno dei quali si producono, lavorano e somministrano alimenti o, più in generale, dove vi sia un frequente passaggio di persone (hall, sale comuni, camere di hotel...)

L'emergenza Coronavirus ci costringe infatti a ripensare al nostro modo di sanificare e ad innalzare i nostri standard igienici.

# Disinfezione Ambientale

**Elettro-nebulizzatore  
idoneo ad erogare  
soluzioni liquide**



NEW JET



nebbia fredda  
costituita da  
piccolissime  
particelle  
disperse in  
aria

**Disinfettante battericida  
Reg.Min.Sal. n.18931  
A base di alchilammine  
Concentrazione  
consigliata 15%- 20%**



SUREDIS



# Disinfezione Ambientale

## Regole da seguire

**NO persone**

- ✓ Assicurarsi che al momento del trattamento il personale ed i clienti non siano presenti

**NO cibi**

- ✓ Alimenti, imballaggi ed attrezzature (bicchieri, bollitori, tazzine, piatti,...) dovranno essere rimossi

**Proteggere**

- ✓ Scollegare e proteggere le apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti (televisori, computer, casse...)

**Risciacquare**

- ✓ Se necessario al termine delle operazioni di «bonifica» effettuare un risciacquo/ rimozione con panno carta monouso sulle superfici che andranno a diretto contatto con gli alimenti

**Soluzione fresca**

- ✓ Preparare le soluzioni da nebulizzare solo al momento dell'uso

**Attendere 3h**

- ✓ Non utilizzare locali nelle 3 ore successive al trattamento

# Disinfezione Ambientale Procedura



Introdurre nel serbatoio la soluzione che si desidera erogare (min 2 L)



Avviare il nebulizzatore: inserire la spina di alimentazione e posizionare l'interruttore su ON



Attendere il tempo necessario  
(in base ai metri cubi vi verranno fornite quantità e tempi)



Concluso il trattamento spegnere l'interruttore



NON utilizzare i locali nelle 3 ore successive

# Disinfezione Ambientale

## Quando eseguirla

1. E' consigliata una **FREQUENZA SETTIMANALE** del trattamento
2. In caso di **ALTO TRAFFICO** di persone o superiore alla media
3. Dopo aver riscontrato la presenza di **PERSONE CONTAGIATE**

